

Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna

W przypadku awarii elektrowni jądowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- Dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu).
- Dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletki (50 mg jodu).
- Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: ½ tabletki (25 mg jodu).
- Noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu).
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Kiedy nie przyjmować leku?

- Jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli masz nadczynność tarczycy.
- Jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią).
- Jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Dühringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uważaj, jeśli:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy,
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek,
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane,
- jesteś odwodniony,
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę.

Pamiętaj! Zwróć się o poradę do lekarza:

- przed przyjęciem leku

- w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,
 - w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu);
- po przyjęciu leku
 - z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Dodatkowe informacje

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa.

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu:

<https://rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl>.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą!

Logotypy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Zdrowia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych